

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE	
Presemina		Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree	
		Acido pelargonico		
		Napropamide		
Pre-emergenza (*)	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Aclonifen (*) (2)	(2) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e	
Pre trapianto	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Aclonifen (*) (2)	(2) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e	
		Flufenacet (*) (3)	(3) Al massimo 1 volta ogni 3 anni e solo in pre-trapianto	
		Metribuzin (*)		
		Pendimethalin (*)		
		S-Metolachlor (4)	(4) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, soia, pomodoro	
		Pyraflufen - etile (5)	(5) Impiegabile al massimo una volta all'anno sulle infestanti a foglia larga	
Post-trapianto (**)	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico		
		Rimsulfuron		
	Dicotiledoni	Metribuzin (*)		
		Pyraflufen - etile (5)	(5) Impiegabile al massimo una volta all'anno sulle infestanti a foglia larga	
	Graminacee		Ciclossidim	
			Fluazifop-p-butile	
		Quizalofop-etile isomero D		
		Propaquizafop		
		Clethodim		

(*) Il diserbo di pre emergenza deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie .

(**) Per il diserbo di post-trapianto si consigliano interventi localizzati

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ L/ha} \times n$. ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.