

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	NOTE
Pre-semina e Pre-trapianto		Glifosate (1)	(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree
		Acido pelargonico	
		Napropamide	
Pre-emergenza (*)	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Aclonifen (*) (2)	(2) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e
		Bifenox (6)	(6) Impiegabile 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
Pre-trapianto	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Aclonifen (*) (2)	(2) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, girasole, pomodoro e
		Flufenacet (*) (3)	(3) Al massimo 1 volta ogni 3 anni e solo in pre-trapianto
		Metribuzin (*)	
		Pendimethalin (*)	
		Bifenox (6)	(6) Impiegabile 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
		Pyraflufen - etile (5)	(5) Una applicazione all'anno sulle infestanti a foglia larga, con schermature
Post-trapianto (**)	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	
		Rimsulfuron	
	Dicotiledoni	Metribuzin (*)	
		Pyraflufen - etile (5)	(5) Una applicazione all'anno sulle infestanti a foglia larga, con schermature
	Graminacee	Ciclossidim	
		Fluazifop-p-butile	
		Quizalofop-etile isomero D	
		Propaquizafop	
		Clethodim	

(*) Il diserbo di pre emergenza deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie .

(**) Per il diserbo di post-trapianto si consigliano interventi localizzati

(1) Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree

Ogni azienda per singolo anno (1 gen. - 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.

Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo $2 \text{ L/ha} \times n$ ha ammissibili è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.

Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per tutte e due le colture.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.

(*) Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 4.

Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione vanno conteggiate le singole sostanze candidate (ad esempio,

una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi)

Si consiglia per contenere la diffusione delle infestanti Orobanche e *Cyperus* spp. di:

- pulire la raccogliatrice e ogni altra attrezzatura dopo le operazioni in campo, in particolare quando si opera in zone già infestate;
- avvisare i contoterzisti della presenza di tali infestanti.
- mantenere traccia degli appezzamenti infestati, per intervenire tempestivamente.

Si consiglia inoltre di mettere in atto rotazioni adeguate, tra le quali:

- per contenere le Orobanche, avvicinare con pisello, mais, soia, sorgo e aglio; al contrario, evitare il favino, che ne incoraggia la diffusione;
- per contenere *Cyperus* spp., avvicinare con cereali, mais ed erba medica, che ne scoraggiano lo sviluppo.